


内視鏡的大腸ポリープ切除術・粘膜切除術を受ける方へ

氏名： 様 担当医師名： 担当看護師名： 担当薬剤師名：

経過	検査前日	当日治療前	当日治療後	検査翌日(退院日)
月 日	／	／	／	／
治療の目標	・前処置について理解ができる。	・処置について理解ができ、実施することができる。 ・安心して治療に臨むことが出来る。	・腹痛や下血などの合併症が起こらない。	・腹痛や下血などの合併症が起こらない。
安静度	・制限はありません		・トイレ歩行のみ可	・激しい運動は避けて下さい。
食事	・朝からエニマクリン食を食べます。(売店で購入できます) ・牛乳、アルコール類は摂取しないでください。	・朝、昼は欠食です。 ・水またはお茶のペットボトル500mlを2本を持参して下さい。	・夕から消化の良い低残渣食が始まります。	・低残渣食を食べていただきます。
清潔	・制限はありません。	・入浴やシャワー浴はできません。		・シャワー浴が出来ます。
排泄		・排便の色を看護師が確認します。 ・排便がきれいな色になるまで下剤を内服します。	・トイレへは歩いて行けます。 ・排便の際は出血がないか確認して下さい。 ・出血があった場合は流さずに看護師にお知らせください。	・排便の際は出血がないか確認して下さい。 ・出血があった場合は流さずに看護師にお知らせください。
検査・処置	・夕食後、マグコロールP 1包を水150mlに溶かして内服して下さい。 ・寝る前に、ピコスルファートナトリウム1本を水200mlに溶かして内服して下さい。	・入院後、腸管洗浄液(モビプレップ)を内服します。	・内視鏡的にポリープを切除します。	
薬剤(内服)	・外来で中止されている薬は内服しないでください。	・朝、中止薬以外の薬を内服して下さい。 ・入院後に自宅で内服している薬を確認します。	・中止薬について主治医に確認後、担当看護師から説明があります。指示に従って内服をしてください。	
患者様及びご家族への説明		・看護師から入院中の生活や下剤の飲み方について説明を行います。	・腹痛や気分不快がある場合は看護師にお知らせください。	・医師の許可で退院が決定します。 ・退院手続きについて看護師から説明を行います。